

PRAXIS AM THEATER

Vertragsärztliche Gemeinschaftspraxis/ Partnerschaftsgesellschaft*
Dr. med. A. Boekstegers - Innere Medizin / Dr. med. E. Sunder-Plassmann - Dermatologie

PG AM GRILLO-THEATER, ERSTER HAGEN 26, 45127 ESSEN

Rabipur-Impfung

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Tollwut ist eine tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Der Erreger, das Tollwutvirus, kann durch den Biss oder den Speichel eines tollwutinfizierten Tieres auf den Menschen übertragen werden.

Der Impfstoff enthält abgetötete Tollwutviren (Totimpfstoff), die die Krankheit nicht mehr auslösen können. Der Körper erkennt sie als Krankheitserreger und bildet Abwehrstoffe (Antikörper) dagegen. Infiziert sich der Körper später mit lebenden Tollwutviren, werden sie von diesen Abwehrstoffen abgefangen. Die Krankheit kann nicht mehr ausbrechen.

Auch nach dem Biss eines tollwutverdächtigen Tieres kann durch die Impfung das Risiko für einen Ausbruch der Erkrankung gemindert werden.

Anwendungsgebiete

- Impfung gegen Tollwut

Wann ist das Medikament nicht für Sie geeignet (Gegenanzeigen)?

- Akute behandlungsbedürftige Erkrankung
- Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff
- Chronische Infektionen
- Erholungsphase nach einer akuten Erkrankung (Rekonvaleszenz)

Schwangerschaft und Stillzeit

- Während der Schwangerschaft darf das Medikament nicht angewendet werden.
- Während der Stillzeit darf dieses Medikament angewendet werden. Eine Medikamentenanwendung während der Stillzeit sollte jedoch generell von Ihrem Arzt entschieden werden.

Nebenwirkungen

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht. Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

- Magen-Darm-Beschwerden (Gelegentlich)
- Schwellung der Lymphknoten (Gelegentlich)
- Gelenkschmerzen (Gelegentlich)
- Reaktionen an der Injektionsstelle (Rötung, Verhärtung, kleine Blutergüsse) (Gelegentlich)
- Allgemeinreaktionen wie Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost (Gelegentlich)
- Überempfindlichkeitsreaktion auf einen Inhaltsstoff (Selten)

Wechselwirkungen

Ein Zeitabstand zu anderen Impfungen ist nicht erforderlich.

Bei Personen, deren Immunsystem abgeschwächt ist oder durch Medikamente unterdrückt wird, kann der Impferfolg eingeschränkt sein oder ausbleiben.

Datum:

Unterschrift:

PatVorname PatNachname PatGebDatum



PRAXENGEMEINSCHAFT
HAUS AM THEATER
I. HAGEN 26
45127 ESSEN-ZENTRUM

Zertifiziert nach ISO 9001

DR. MED. A.
BOEKSTEGERS*
FACHARZT F. INNERE
MEDIZIN
GASTROENTEROLOGIE
PROKTOLOGIE
STRAHLENSCHUTZARZT
NRW

B. SEIDLITZ-FEHLINGS*
FACHÄRZTIN F. INNERE
MEDIZIN

DR. MED. A.
HETTSTEDT***
ÄRZTIN

DR. MED. S. SCHÜTTE**
FACHÄRZTIN F. INNERE
MEDIZIN

DR. MED. S. BERGUNDE
FACHARZT F.
ANÄSTHESIOLOGIE
SPEZ. ANÄSTH.
INTENS.MEDIZIN
AKUPUNKTUR, TCM

DR. MED. R.
BOEKSTEGERS **
FACHÄRZTIN F.
DERMATOLOGIE UND
ALLERGOLOGIE

H.H. BLETGTEN**
PFARRER i.R.
LEBENSBERATUNG

TELEFON 0201/ 827 200
TELEFAX 0201/ 827 20 10
WWW.DR-
BOEKSTEGERS.DE

DR. MED. E.
SUNDER-PLAßMANN*
FACHÄRZTIN F.
DERMATOLOGIE
ALLERGOLOGIE
MED.-DERM.
KOSMETOLOGIE

TELEFON 0201/ 23 70 41

* Gemeinschaftspraxis
** nur Privatmedizin
*** in Ausbildung

DR. MED. E.
PIERCHALLA
FACHÄRZTIN F.
ALLGEMEINMEDIZIN

TELEFON 0201/ 827 20 20

24-STUNDEN-REZEPT-
HOTLINE
0201/ 8272055