

Krebserkrankungen in Ihrer Familie

PatVorname PatNachname

Ihr(e) Bruder/ Schwester

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Eigene Erkrankungen

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Weitere (r) Bruder/ Schwester

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Ihr (e) Tante/ Onkel väterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Ihr Vater

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Ihre Mutter

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- andere

Ihr (e) Tante/ Onkel mütterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Ihre Großmutter väterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- andere

Ihr Großvater väterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Ihre Großmutter mütterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- andere

Ihr Großvater mütterl.

- Lungenkrebs
- Brustkrebs
- Darmkrebs
- Magenkrebs
- Unterleibskrebs
- Prostata
- andere

Überarbeitete Bethesda-Kriterien

MSI (Mikrosatelliten-Instabilität) Untersuchungen sollten bei Patienten mit Tumoren untersucht werden wenn:

1. KRK vor dem 50. Lebensjahr
2. Zweitumor (KRK, Endometrium, Magen, Ovar, Pankreas, Ureter, Niere, Hirn, biläres System, Haut)
3. KRK vor dem 40. Lebensjahr mit MSI-H Histologie
4. KRK mit mindestens 1 erstgradigen Verwandten: HNPCC-assoziiertes Tumor, mindestens 1 Tumor vor dem 50. Lebensjahr
5. Diagnose eines KRK bei 2 oder mehr erstgradig Verwandten mit einem HNPCC-assoziierten Tumor unabhängig vom Alter

Amsterdam-Kriterien:

1. Mindestens 3 Familienmitglieder mit HNPCC-assoziierten Karzinomen (Kolon/ Rektum, Endometrium, Dünndarm, Urothel [Ureter/ Nierenbecken])
2. Mindestens 2 aufeinander folgende Generationen betroffen
3. 1 Familienmitglied erstgradig verwandt mit den beiden anderen
4. 1 Erkrankter zum Zeitpunkt der Diagnose jünger als 50 Jahre
5. Ausschluss einer familiären adenomätösen Polyposis

